



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ПОДРОСТКИ

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ



Глобальные цели в области ВИЧ-инфекции

Покончить с
эпидемией СПИДа

НОЛЬ
новых случаев
ВИЧ-инфекции

НОЛЬ дискриминации

НОЛЬ смертей
вследствие
СПИДа

СВЯЗАННЫЙ СО
СПИДОМ ЦЕЛЕВОЙ
ОРИЕНТИР ЦУР НА
2030 Г.



Особенности ВИЧ-инфекции в РФ сегодня

- ✓ Распространение в общей популяции населения (**60%** новых случаев – заражение при половых контактах)
- ✓ **> 80 тыс** новых случаев в год
- ✓ Около **1 млн** людей, живущих с ВИЧ
- ✓ Широкие возможности для раннего выявления ВИЧ-инфекции
- ✓ Хроническое заболевание, поддающееся лечению
- ✓ Широкая доступность и высокая эффективность антиретровирусной терапии
- ✓ При раннем выявлении и раннем начале лечения (АРТ) продолжительность жизни – как средняя в популяции

**ВИЧ не
приговор**

№38-ФЗ

«О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»



Статья 17: Запрет на ограничение прав ВИЧ-инфицированных

Не допускаются увольнения с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в образовательные учреждения и учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также ограничения иных прав и законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции...





Противодействие ВИЧ-инфекции в РФ

Основные задачи Государственной стратегии

Повысить информированность населения

Повысить охват населения профилактическими программами

Повысить охват обследованием на ВИЧ-инфекцию

Повысить охват наблюдением и лечением лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией

Зарегистрированное в РФ количество лиц с антителами к ВИЧ и новые случаи



Зарегистрированное в РФ количество подростков 15-17 лет

Подростки 15-17 лет составляют 39% среди детей, живущих с ВИЧ



Пути заражения ВИЧ-инфекцией у подростков

Рискованное поведение



Наркотики




Незащищенные
половые
контакты



От матери во время
беременности, родов,
грудного вскармливания

Концентрация ВИЧ в биологических жидкостях определяет степень риска при контакте



Количество вирусных частиц в 1 мл биологической жидкости

Подростки – уязвимая социальная группа

> 450 тысяч подростков 15-17 лет обследованы на ВИЧ в 2018г

> 15,5 тысяч – в связи с беременностью

> 10 тысяч – в связи с половыми инфекциями

> 2,5 тысяч – в связи с употреблением наркотиков


> 2 тысяч – в связи с пребыванием в ФСИН

> 1 тысячи – обследованы по контакту

Девушки – в зоне особого риска


ВАЖНО

Новые случаи ВИЧ-инфекции у подростков 15-17л




Низкая приверженность – главная причина смерти у подростков с ВИЧ-инфекцией

Подростки – единственная возрастная группа, где смертность растет




Приверженность АРТ у подростков и молодых людей в разных частях света




- Мета-анализ, 53 страны, n=10 725, возраст 12-24 г
- Ср. приверженность 62,3% (95%ДИ 57,1-67,6%)
- ЛЖВ – 3190/ 3379/116/1676/297
- Женщины – 52/65/40/45/54%

Половые и возрастные особенности мозга

Мужчины и женщины



Подростки




Дети




Отношения с родителями и приверженность АРТ

Без любви, понимания
и уважения ничего не получится



- Гармоничные отношения
- Скомпенсированные отношения
- Нарушенные отношения



- Высокая приверженность
- Нарушенная приверженность
- Низкая приверженность



Порядок обследования подростков на ВИЧ-инфекцию

30 марта 1995 года N 38-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)

(в ред. Федеральных законов [от... 23.05.2016 N 149-ФЗ](#))

Статья 7. Медицинское освидетельствование

5. Медицинское освидетельствование несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет может проводиться при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из родителей или иного законного представителя

Статья 13. Право ВИЧ-инфицированного на получение информации о результатах медицинского освидетельствования

2. В случае выявления ВИЧ-инфекции у несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет, работник медицинской организации, проводившей медицинское освидетельствование, уведомляет об этом одного из родителей или иного законного представителя таких лиц. (в ред. Федерального закона [от 25.11.2013 N 317-ФЗ](#))

Профилактика ВИЧ-инфекции у подростков

Формирование здорового образа жизни

Половое воспитание.
Обучение правилам безопасного полового поведения

Подготовка к семейной жизни

Повышение информированности о путях заражения ВИЧ-инфекцией

Обучение безопасному поведению в отношении ВИЧ-инфекции и других заболеваний, передающихся через кровь и половым путем